lue deux fois No. 34. Observation 21. à joindre a de paris.

sur un volvulus d'une Espece singuliere.

Didiet

Le nommé Mathurin Portier détenu dans l'hopital de Bicêtre pour Cause de Démence mourut subitement vers le milieu de décembre 1760. agé d'environ soixante et dix ans ; son Cadavre ayant été transporté dans les Ecoles de chirurgie, nous fumes fort surpris lors de l'ouverture que nous en fimes, d'appercevoir aux environs de la Region hypogastrique, une portion d'jntestin si prodigieusement gonflée quelle egaloit le volume d'un Estomach dans son etat de plenitude (c'etoit la portion du colon qui forme l'S Romaine) nous Crumes dabord que cette tumefaction extraordinaire etoit le produit d'une accumulation de matieres stercorales arrestées dans cet endroit par quelqu'obstacle qui en avoit empesché la déviation, et nous remimes a nous en eclaircir apres l'examen des jntestins qui precedent le colon. Parvenus a l'jleum qui nous parut d'un tiers moins long qu'a l'ordinaire et cherchant l'endroit de son jnsertion dans le coecum, jl ne nous fut pas possible de l'appercevoir, la place quil doit occuper etoit jsolée le colon du meme coté, sa portion qui forme le grand arc et une grande partie de celle qui occupe le coté gauche, toutes ces parties dis je etoient vertiés et pour ainsi dire repliées dans elles memes et s'etoient arrestées dans l'endroit ou j'ay dit que parut dabord le gonflement. jl est aisé de s'imaginer quel etoit le Dérangement de la partie du Mésentère destinée a Lier plus ou moins le colon avec les organes qui l'avoisinent, aussi trouvames nous en plusieurs endroits des portions du Mesocolon disposées en maniere de sangles ou de Brides lesquelles de la partie laterale droitte se portoient transversalement vers la gauche en passant par dessus les circonvolutions des jntestins greles lesquelles devoient considerablement nuire à leurs fonctions. Nous observames de plus que l'urethere du coté droit à raison du tirallement quil avoit souffert avoit changé de situation, ensorte quil

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 52 n°26

passoit par dessus les circonvolutions voisines des intestins pour se rendre — dans le lieu de sa destination.

Le tems ne nous ayant pas permis de pousser plus loing nos recherches, et voulant d'ailleurs faire part à l'Academie de la singularité de ce fait avant de faire l'ouverture de cette piece, je l'enlevai avec autant de précaution quil me fut possible afin de n'y occasionner aucun dérangement et la presentai le jeudi 18. xbre. L'academie mayant chargée de luy faire un Rapport historique et circonstancié de ce que j'aurois observée, je fis le lendemain 19 l'ouverture de cette tumeur intestinale, en presence de m.rs Duclos, de la porte, Herault, Duplessis, Delafitte ~~et~~ Alors plusieurs autres — et nous apperçumes dabord une double invagination, car ayant ouvert le colon dans toute l'etendue de la tumeur quil formoit, nous trouvames un second cilindre intestinal et dans celuy ci un troisieme, ce dernier etoit formé par deux aulnes ou environ de l'intestin ileum, et une partie proportionnée du mesentere; le second par le coecum, son appendice vermiforme et les deux tiers du colon replié dans luy meme ensemble une portion de l'epiploon et ce dernier avoit été presque totalement entrainé du coté gauche. j'examinai aussi l'état de l'estomac dont la capacité etoit de beaucoup supérieure à celle quil auroit du avoir.

Ce fait venant à l'appui de celuy que nous a communiqué m.r Le Blanc chirurgien d'orleans et qui a fixé l'admiration de l'Academie, pourra engager doresnavant les chirurgiens a faire plus frequemment des recherches sur de pareilles découvertes qui peut etre sont moins rares quon la cru jusquici.

Dans la meme seance ~~Academique~~ m.r sabattier membre de cette Academie luy presenta une invagination du Coecum presqu'entierement engagé dans le commencement du colon ensemble l'insertion de l'ileum dans le coecum ce qui — formoit une tumeur tres dure et fort voluminuse.

Enfin je terminerai ce recit en faisant observ~~ant~~ a l'Academie que la semaine derniere parcourant le canal intestinal d'un sujet destiné a mes demonstrations Anatomiques j'ay eu occasion de remarquer huit a neuf volvulus distincs les uns des autres l'un desquels etoit si considerable quil contenoit pour le moins deux Aulnes de

le intestin ileum, la moitié de ce volvulus etoit faitte par l'intestin replié dans luy meme de haut en bas, et l'autre moitié par le meme intestin engagé de meme, mais dans un sens contraire, c'est a dire de bas en haut.

Didier 2e

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE